

Nutramigen*

LGG®



Formule Hypoallergénique Hypoallergene voeding

Pour la prise en charge diététique de l'allergie aux protéines du lait de vache

Dieetvoeding bij koemelkallergie

- Nutritionnellement adapté dans le cadre d'une alimentation diversifiée
- Réduction rapide des manifestations allergiques
- Avec du Lactobacillus GG
- Geschikt als onderdeel van een gevarieerd dieet
- Snelle vermindering van allergische verschijnselen
- Bevat Lactobacillus GG

2

A partir de 6 mois
Vanaf 6 maanden

400g e

MeadJohnson
Nutrition

6-12 mois
> 1 an

Service

3. Ajoutez le nombre nécessaire de mesurette **arrosée** de poudre (cf. tableau d'alimentation). Conservez la mesurette **sèche** dans la boîte.

4. Fermez le biberon. Roulez-le et **secouez-le bien** jusqu'à dissolution complète de la poudre. Vérifiez la température sur l'intérieur de votre poignet.

de manganèse, huile de sésame,
sodium, sélénite de sodium, cobalt,
Energie (2100 kJ/290 kJ) (500
calories) 400 mg (100 mg)
acide linoléique g (400,54 g)
docosahexaénoïque mg (119,95 g)
sodium g (440,46 g), vitamine E
µg (405,4 g), vitamine B6 mg (587,4
g) (7,74 µg), vitamine B9 mg (10,50
g) (1,050,42 µg), biotine µg (10,514
mg) (700,95 µg), cholestérol mg
(350,47 g), magnésium mg (10,514
mg) (380,05 mg), manganèse mg
µg (152 g), myo-inositol µg (152,1
mg) (152,1 mg), myo-inositol µg
270 mEq. Exprimé en équivalents
alimentaires (EAL). © Recueil des
Massy, France.

de la Recherche 20-8-1070
Nutrition, Middelkerke 20-8-1070
de Mead Johnson Nutrition, 20-8-1070
(GG) est une marque déposée de
est une marque de préférence

400g e 2040705

Destinée à des Fins Médicales Spéciales

Tableau indicatif d'alimentation sauf autre recommandation de votre médecin :

Age	Biberons / 24 h	Eau (ml)	+ mesurette ^Δ	Quantité moyenne reconstituée (ml)
6 - 12 mois	2 - 3	210	7	230
> 1 an	2	210	7	230

^ΔUtiliser **uniquement** la mesurette de la boîte pour mesurer la poudre. 1 mesurette rase (4,5 g) pour 30 ml d'eau. Ne pas tasser la poudre dans la mesurette mais l'asurer avec le dos d'un couteau propre et sec.

0 009 Service gratuit + prix appel +32 (0)2 456 99 61

Quantité nécessaire de
mesures de poudre (cf
alimentation). Conservez
la poudre sèche dans la boîte.



**5. Une fois reconstituée, la formule
peut devenir rapidement impropre à la
consommation. Donnez la formule
immédiatement après sa préparation.**

Une fois l'alimentation commencée, la
formule doit être utilisée dans l'heure qui suit et ne pas
être conservée au réfrigérateur. Jetez le restant de la
formule préparée et nettoyez tous les ustensiles. **Ne
congelez jamais une formule préparée.**

biberon. Roulez-le et
jusqu'à dissolution
la poudre. Vérifiez la
sur l'intérieur de votre

de manganèse, iode de sodium, acide folique, chlorure de chrome, phytoménadione, molybdate de
sodium, sélénite de sodium, cholestérol, D-biotine, cyanocobalamine. **Nutriments pour (100g/100ml) :**
Energie (2100 kJ/290 kJ) / (500 kcal/68 kcal), matières grasses g (25/3,4) dont saturées g (10,5/1,42),
acide linoléique g (4,0/0,54), acide α-linolénique mg (330/45), acide arachidonique mg (170/23), acide
docosahexaénoïque mg (115/15,5), glucides g (57/7,7) dont sucres g (26/3,5), protéines g (12,5/1,69),
sel g (0,44/0,06), vitamine A µg (480/65), vitamine D µg (12,5/1,7), vitamine E mg† (5,0/0,67), vitamine K
µg (40/5,4), vitamine C mg (55/7,4), thiamine mg (0,48/0,064), riboflavine mg (0,63/0,084), niacine mg
(7,7/1,04), vitamine B6 mg (0,65/0,088), folate µg† (100/13,5), acide folique µg (60/8,1), vitamine B12 µg
(1,05/0,142), biotine µg (10,5/1,42), acide pantothénique mg (3,8/0,51), sodium mg (175/24), potassium
mg (700/95), chlorures mg (350/47), calcium mg (600/81), phosphore mg
(350/47), magnésium mg (60/8,1), fer mg (8/1,08), zinc mg (5,5/0,74), cuivre
mg (0,38/0,051), manganèse mg (0,15/0,02), sélénium µg (17,5/2,4), chrome
µg (15/2), molybdène µg (15,5/2,1), iode µg (115/15,5), choline mg (120/16,2),
inositol mg (85/11,5), L-carnitine mg (11/1,49), taurine mg (30/4,1), osmolarité
270 mOsm/L. †Exprimé en α-tocophérol. ‡Exprimé en équivalent en folates
alimentaires (EFA). © Reckitt Benckiser France, 38 Rue Victor Basch, 91300
Massy, France. © Reckitt Benckiser Healthcare (Belgium) NV/SA, Allée
de la Recherche 20, B-1070 Bruxelles, Belgique. Fabriqué par : Mead Johnson
Nutrition, Middelkampweg 2, 6545 CJ Nijmegen, Pays-Bas. *Marque déposée
de Mead Johnson Nutrition. © 2020 Reckitt Benckiser. Tous droits réservés.
L'LG® est une marque déposée de Chr. Hansen A/S.
A consommer de préférence avant le (EXP) : voir sous la boîte.



400g e 2040705 Conditionné sous
atmosphère protectrice.

Nutramigen 2 LGG poeder - Voeding voor medisch gebruik

Eigenschappen, kenmerken en reden voor gebruik: Nutramigen 2 LGG met intensief gehydrolyseerde caseïne-eiwitten is speciaal ontwikkeld voor zuigelingen met koemelkallergie. Nutramigen bevat ook Lactobacillus GG, een combinatie die een gunstig effect heeft op de aanpak van koemelkallergie en helpt uw baby sneller* weer een normaal dieet te volgen. Intensief gehydrolyseerde voeding smaakt en ruikt anders dan standaardvoeding, geef uw baby de tijd om eraan te wennen. De smaak van Nutramigen 2 LGG is speciaal ontwikkeld om de acceptatie door oudere zuigelingen vanaf 6 maanden te ondersteunen. Nutramigen 2 LGG bevat alle voedingsstoffen die uw baby nodig heeft, als onderdeel van een gevarieerd dieet. *Vergeleken met Nutramigen zonder LGG.

Voedingsrichtlijnen

Leeftijd	Flesjes (24h)
6 - 12 maanden	2 - 3
> 1 jaar	2

Δ Gebruik alleen het bijgeleverde maatschepje (4,5g) per 30 ml water. Het af met de achterkant van een lepel.

Voor meer informatie bezoek www.nutramigen.nl / www.nutramigen.be

Of telefonisch

Bereidings- en gebruiksinstructies



1. Was uw handen grondig. Reinig flesjes, spenen, doppen en overig toebehoren in water (1 minuut in doorkokend water).



3. Voeg het benodigde aantal afgestreken schepjes poeder toe (zie voedingsrichtlijnen). Bewaar het droge maatschepje in het blik.



2. Kook vers water. Laat het afkoelen tot kamertemperatuur. Giet de benodigde hoeveelheid water in een schone fles.



4. Sluit de fles, rol en schud goed totdat het poeder volledig is opgelost. Controleer de temperatuur aan de binnenkant van uw pols.

Belangrijk: Borstvoeding is de beste voeding. Nutramigen 2 LGG is geschikt voor zuigelingen vanaf 6 maanden. Het is bedoeld als diëtvoeding bij koemelkallergie en maakt deel uit van een gevarieerd dieet. Nutramigen 2 LGG kan niet als enige voedingsbron worden gebruikt. Baby's die deze voeding krijgen, kunnen frequent dunne ontlasting hebben van een groenachtige kleur. Nutramigen 2 LGG moet worden gebruikt onder medisch toezicht en kan niet worden gebruikt als vervanging van borstvoeding tijdens de eerste 6 maanden van het leven. Raadpleeg uw arts met betrekking tot de juiste bijvoeding voor uw zuigeling. **Waarschuwing:** In het belang van de gezondheid van uw baby raden we u aan de instructies voor bereiding en gebruik nauwkeurig op te volgen. Bij het klaarmaken van de voeding is het belangrijk te letten op goede hygiëne, bereiding, verdunning, gebruik en opslag. Gebruik geen magnetron om de voeding op te warmen. Poeder voor zuigelingen is niet steriel en mag niet aan zuigelingen worden gegeven die een probleem met het immuunsysteem hebben, tenzij dit op aanwijzing en onder toezicht van de arts van uw baby plaatsvindt. **Het niet opvolgen van deze instructies kan ernstige gevolgen hebben.** Niet voor intraveneus gebruik. **Bewaren van het poeder:** Bewaar het blik op een koele, droge plaats. Sluit het blik na opening weer goed af, bewaar het op een droge plaats en gebruik de inhoud binnen één maand. Vries het poeder niet in en vermijd blootstelling aan extreme hitte. **Ingrediënten:** Glucosestroop, plantaardige oliën (palmolie, kokos, soja, zonnebloemolie rijk aan oliezuur), intensief gehydrolyseerd caseïne (uit melk), fructose, gemodificeerd maïszetmeel, calciumcitraat, kaliumcitraat, calciumchloride, cholinechloride, L-cystine, natriumcitraat, natrium-L-ascorbaat, L-tyrosine, inositol, L-tryptofaan, iper(II)sulfaat, taurine, Lactobacillus rhamnosus GG bacterie cultuur (0,02%), zinksulfaat, L-carnitine, nicotinamide, DL-alfa-tocoterylacetaat, ascorbyl palmitaat, ascorbinezuur, calciumpantothenaat, koper(II)sulfaat, retinyl palmitaat, pyridoxinehydrochloride, riboflavine, thiaminehydrochloride, mangaansulfaat, natriumjodide, foliumzuur, chroom(III)chloride, fytomenadion, natriummolybdaat, natriumseleniet, cholecalciferol, D-biotine.

Energie (2100 kJ/290 kJ/500 kcal) uit
linolzuur g (4,0/0,54), α-linoleenzuur mg
mg (115/15,5), koolhydraten g (50/7,7)
(0,44/0,06), vitamine A µg (40/0,65), vitamine
µg (40/0,65), vitamine C mg (16/0,25), vitamine
mg (7,7/1,04), vitamine B6 mg (0,6/0,08),
B12 µg (1,05/0,142), biotine µg (0,5/0,065),
kalium mg (700/95), chloride mg (150/20),
mg (60/8,1), ijzer mg (8/1,08), zink mg (15/2),
selen µg (17,5/2,4), chroom µg (15/2),
(120/16,2), inositol mg (35/1,5), L-carnitine
mOsm/L. *Uitgedrukt als α-tocotrienol.
© Reckitt Benckiser Healthcare B.V.
Geproduceerd door: Mead Johnson Nutrition
*Handelsmerk van Mead Johnson Nutrition
LGG® is een geregistreerd handelsmerk van Mead Johnson Nutrition



Medisch gebruik

Voedingsrichtlijnen, tenzij uw arts u een ander advies geeft.

Leeftijd	Flesjes /24u	Water (ml)	+ maatschepjes ^Δ	Gem. hoeveel. bereide voeding (ml)
6-12 maanden	2-3	210	7	230
> 1 jaar	2	210	7	230

^ΔGebruik alleen het bijgeleverde maatschepje om het poeder af te meten. Eén afgemeten maatschepje (4,5g) per 30 ml water. Stamp het poeder niet aan in het schepje, maar strijk het af met de achterkant van een schoon, droog mes.

gen.be Of telefonisch NL 0800-4455001 / BE +32 (0)2 456 99 61

et benodigde aantal
en schepjes poeder toe (zie
richtlijnen). Bewaar het droge
schepje in het blik.

de fles, rol en schud goed totdat
er volledig is opgelost. Controleer
temperatuur aan de binnenkant van uw



**5. Eenmaal bereide
voeding kan snel bederven.
Geef de voeding direct na
bereiding. Na de start van
het voeden, de voeding
binnen 1 uur gebruiken en niet in de koelkast
bewaren. Gooi resterende bereide voeding
weg en maak alle toebehoren schoon. Vries
bereide voeding niet in.**

natrumseleniet, cholecalciferol, D-biotine, cyanocobalamine. **Voedingswaarde per (100g/100ml):**
Energie (2100 kJ/290 kJ)/(500 kcal/68 kcal), vet g (25/3,4) waarvan verzadigd g (10,5/1,42),
linolzuur g (4,0/0,54), α -linolzuur mg (330/45), arachidonzuur mg (170/23), docosahexaëenzuur
mg (115/15,5), koolhydraten g (57/7,7) waarvan suikers g (26/3,5), eiwitten g (12,5/1,69), zout g
(0,44/0,06), vitamine A μ g (480/65), vitamine D μ g (12,5/1,7), vitamine E[†] mg (5,0/0,67), vitamine K
 μ g (40/5,4), vitamine C mg (55/7,4), thiamine mg (0,48/0,064), riboflavine mg (0,63/0,084), niacine
mg (7,7/1,04), vitamine B6 mg (0,65/0,088), folaat[‡] μ g (100/13,5), foliumzuur μ g (60/8,1), vitamine
B12 μ g (1,05/0,142), biotine μ g (10,5/1,42), pantotheenzuur mg (3,8/0,51), natrium mg (175/24),
kalium mg (700/95), chloride mg (350/47), calcium mg (600/81), fosfor mg (350/47), magnesium
mg (60/8,1), ijzer mg (8/1,08), zink mg (5,5/0,74), koper mg (0,38/0,051), mangaan mg (0,15/0,02),
selen μ g (17,5/2,4), chroom μ g (15/2), molybdeen μ g (15,5/2,1), jood μ g (115/15,5), choline mg
(120/16,2), inositol mg (85/11,5), L-carnitine mg (11/1,49), taurine mg (30/4,1), osmolariteit 270
mOsm/L. [†]Uitgedrukt als α -tocopherol. [‡]Uitgedrukt als folatequivalent in voeding (DFE).
© Reckitt Benckiser Healthcare B.V., Siriusdreef 14, 2132WT Hoofddorp, Nederland.
© Reckitt Benckiser Healthcare (Belgium) NV/SA, Researchdreef 20, B-1070 Brussel, Belgium.
Geproduceerd door: Mead Johnson Nutrition, Middenkampweg 2, 6545 CJ Nijmegen, Nederland.
*Handelsmerk van Mead Johnson Nutrition. © 2020 Reckitt Benckiser. Alle rechten voorbehouden.
LG6® is een geregistreerd handelsmerk van Chr. Hansen A/S.

2041313 2061056 / P436000



Ten minste houdbaar tot
(EXP): zie onderkant blik.
Verpakt onder
beschermende atmosfeer.

400g e