



Nutramigen

LGG®



Formule Hypoallergénique Hypoallergene voeding

Pour les besoins nutritionnels en cas d'allergie aux protéines du lait de vache
Dieetvoeding bij koemelkallergie

- Nutritionnellement complet pour les besoins nutritionnels des nourrissons
- Réduction rapide des manifestations allergiques
- Avec du Lactobacillus GG (LGG®)
- Voorziet in de dagelijkse voedingsbehoefte van baby's
- Snelle vermindering van allergische verschijnselen
- Bevat Lactobacillus GG (LGG®)

⚠ Les instructions de préparation diffèrent des autres formules : vérifiez-les et suivez-les attentivement.
De bereidingsinstructies verschillen van andere voedingen: controleer en volg zorgvuldig op.

400g e

MeadJohnson
Nutrition

1

0-6 mois
0-6 maanden

Eigenschappen, kenmerken en reden voor gebruik: Nutramigen 1 LGG is nutritioneel compleet en speciaal ontwikkeld voor baby's met een koemelkallergie. Nutramigen bevat een combinatie van intensief gehydrolyseerde caseïne-eiwitten en Lactobacillus GG, die een gunstig effect heeft op de aanpak van koemelkallergie en uw baby helpt om sneller een normaal dieet te volgen*. Intensief gehydrolyseerde voeding smaakt en ruikt anders dan standaard voeding, geef uw baby de tijd om aan te wennen. Mead Johnson Nutrition houdt zich al ruim 75 jaar bezig met wetenschappelijk onderzoek naar de voedingsbehoeften van zuigelingen met koemelkallergie, met meer dan 75 klinische onderzoeken met Nutramigen zonder LGG.

medisch gebr
Voedingsrichtlijnen

Leeftijd	Geslacht
0-2 weken	2-3 kg
2-4 weken	3-4 kg
1-2 maanden	4-5 kg
2-4 maanden	5-6 kg
4-6 maanden	6-7 kg

^aGebruik alleen het bijgevoegde maatlepel (4,5 g) per 30 ml water. Stamp het poeder goed door een schoon, droog mes.

1. Was uw handen grondig.
Reinig flesjes, spenen, doppen
en overig toebehoren in water
(1 minuut in doorkokend water)



- 3. Voeg het benodigde aantal afgestreken schepjes poeder toe (zie voedingsrichtlijnen). Bewaar het droge maatschepje in het blik.**



- 

- 2. Kook vers water. Laat het afkoelen tot kamertemperatuur. Giet de benodigde hoeveelheid water in een schone fles.**



- 4.** Sluit de fles, rol en schud goed totdat het poeder volledig is opgelost (tenminste 1 minuut). Controleer de temperatuur aan de binnenkant van uw pols.

Belangrijk: Borstvoeding is de beste voeding voor baby's. Nutramigen 1 LG6 is geschikt voor baby's van 0-6 maanden, wanneer geen borstvoeding wordt gegeven. Nutramigen 1 LG6 is een dieetvoeding bij koemelkallergie en kan als enige voedingsbron worden gebruikt. Baby's die deze voeding krijgen, kunnen frequent dunne ontlastingstussen hebben met een groenige kleur. Nutramigen 1 LG6 moet worden gebruikt onder medisch toezicht. **Waarschuwing:** In het belang van de gezondheid van uw baby raden we u aan de instructies voor bereiding en gebruik nauwkeurig op te volgen. Bij het klaarmaken van de voeding is het belangrijk te letten op goede hygiëne, bereiding, verdunding, gebruik en opslag. Gebruik geen magnetron om de voeding op te warmen. Poeder voor zuigelingen is niet steriel en mag niet worden gegeven aan prematures of zuigelingen die mogelijk een probleem met het immuunsysteem hebben, tenzij dit op aanwijzing en onder toezicht van de arts van uw baby plaatsvindt. Vraag altijd aan de arts van uw baby welke voeding het meest geschikt is voor uw baby. Het niet opvolgen van deze instructies kan ernstige gevolgen hebben. Niet voor intraveneus gebruik. **Bewaren van het poeder:** Bewaar het blik op een koele, droge plaats. Sluit het blik na opening weer goed af, bewaar het op een droge plaats en gebruik de inhoud binnen één maand. Vries het poeder niet in en vermijd blootstelling aan extreme hitte. **Ingrediënten:** Glucosestroop, gehydrateerd caseïne (uit melk), gemodificeerd maïszetmeel, calciumcitraat, calciumfosfaat, calciumstoftaat, olie van Mortierella alpina, kaliumchloride, kaliumlactaat, calciumstoftaat, olie van de microgale Schizochytrium sp., cholinechloride, natriumchloride, L-cystine, inositol, ascorbinezuur, L-tyrosine, L-tryptofaan, taurine, ijzer(II)sulfaat, Lactobacillus rhamnosus GG bacterie cultuur (0,02%), D-lactitol, DL-alpha-tocoferylacetate, zinkstoftaat, ascorbyl palmitaat, nicotinamide, retinylpalmitaat, calciumpanthoënaat, perill(sulfaat), thiaminehydrochloride, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, mangansulfaat, natriumjodide, foliumzuur, natriumpolydiborate, fytomenadiol.

chrom(III)chloride, natriumse
Voedingswaarde per 100 g
vetten g (25,3.4) waarvan verzadigd
(350/47), arachidonzuur mg (145/18)
ten g (55/7.4) waarvan saturaten
mine A µg RE (450/61), vitamine E
natrium K µg (65/8.7), vitamine D
(0.45/0.061), nicotine mg (240/20)
foliumzuur mg (80/10.8), vitamine
B (2.5/0.34), natrium mg (240/20)
mg (57/0.76), koper mg (3.5/0.47)
(3.5/0.47), fosfor mg (3.80/0.55)
chrom µg (11/1.48), molybdeen
(165/22), molybdeen mg (85/11.4), molybdeen
teit = 270 mOsm/L.

Geproduceerd door: Mead Johnson
725 East Main Ave, Zandvoort
(BE) (LUX) Reckitt Benckiser Healthcare
Brussel, Belgium, (NL) Reckitt Benckiser
Hooftdorp, Nederland

*Handelsmerk van Mead Johnson
© 2020 Reckitt Benckiser Nederland
LGG* is een geregistreerd handelsmerk

voor medisch gebruik

Voedingsrichtlijnen, tenzij uw arts u een ander advies geeft.

Leeftijd	Geschat gewicht	Flesjes/24u	Water (ml)	+ Maatschepjes*
0-2 weken	<3-3,5 kg	6	90	3
2-4 weken	3,5-4 kg	5-6	120	4
1-2 maanden	4-5 kg	5	150	5
2-4 maanden	5-6,5 kg	4-5	180	6
4-6 maanden	>6,5 kg	4	210	7

*Gebruik alleen het bijgeleverde maatschepje om het poeder af te meten. Eén afgestreken maatschepje (4,5 g) per 30 ml water. Stamp het poeder niet aan in het schepje, maar strijk het af met de achterkant van een schoon, droog mes.

n.be
r1

nodig aantal
schepjes poeder toe
voeg (inlopen). Bewaar
schepje in het blik.

rol en schud goed totdat het
g is opgelost (tenminste 1 minuut).
temperatuur aan de binnenkant van



5. Eenmaal bereide voeding kan snel bederven. Geef de voeding direct na bereiding. Na de start van het voeden, de voeding binnen 1 uur gebruiken en niet in de koelkast bewaren. Gooi resterende bereide voeding weg en maak alle toebehoren schoon. **Vries bereide voeding niet in.**

chromium(III)chloride, natriumseleniet, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine.
Voedingswaarde per (100 g/100 ml): Energie (2098 kJ/284 kJ)/(501 kcal/68 kcal),
vetten g (25/3,4) waarvan verzadigd g (10/1,35), linolzuur g (4/0,54), α -linoleenzuur mg
(350/47), arachidonzuur mg (145/19,5), docosahexaeenzuur mg (115/15,5), koolhydra-
ten g (55/7,4) waarvan suikers g (5,7/0,77), eiwitten g (14/1,88), zout g (0,6/0,08), vita-
mine A μ g RE (450/61), vitamine D μ g (12,5/1,68), vitamine E mg α -tocopherol (4,5/0,61),
vitamine K μ g (65/8,7), vitamine C mg (60/8,1), thiamine mg (0,4/0,054), riboflavine mg
(0,45/0,061), niacine mg (5/0,67), vitamine B6 mg (0,3/0,04), folaat μ g DFE (135/18,2),
foliumzuur μ g (80/10,8), vitamine B12 μ g (1,5/0,2), biotine μ g (15/2), pantotheenzuur
mg (2,5/0,34), natrium mg (240/32), kalium mg (610/82), chloride mg (480/65), calcium
mg (570/76), fosfor mg (390/52), magnesium mg (38/5), ijzer mg (9/1,21), zink mg
(3,5/0,47), koper mg (0,38/0,05), mangaan mg (0,125/0,017), seleen μ g (17,5/2,4),
chromium μ g (11/1,48), molybdeen μ g (28/3,8), jodium μ g (115/15,5), choline mg
(165/22), inositol mg (85/11,4), L-carnitine mg (12,5/1,68), taurine mg (30/4), osmolari-
teit = 270 mOsm/L.

Geproduceerd door: Mead Johnson Nutrition,
725 East Main Ave, Zeeland, Michigan 49464, USA.

(BE) (LUX) Reckitt Benckiser Healthcare (Belgium) NV/SA, Researchdreef 20, B-1070
Brussel, Belgium. (NL) Reckitt Benckiser Healthcare B.V., Siriusdreef 14, 2132WT
Hofdordorp, Nederland

*Handelsmerk van Mead Johnson Nutrition
© 2020 Reckitt Benckiser Nederland / Belgium.

LG® is een geregistreerd handelsmerk van Chr. Hansen.

Ten minste houdbaar tot
(EXP): zie onderkant blik.
Verpakt onder
beschermende atmosfeer.

400g^e



Formule Destinée à des Fins Médicales Spéciales

Tableau indicatif d'alimentation, sauf autre recommandation de votre médecin :

Age	Poids moyen	Biberons/ 24 h	Eau (ml)	+ mesurétiques*
0-2 semaines	<3-3,5 kg	6	90	3
2-4 semaines	3,5-4 kg	5-6	120	4
1-2 mois	4-5 kg	5	150	5
2-4 mois	5-6,5 kg	4-5	180	6
4-6 mois	>6,5 kg	4	210	7

*Utilisez **uniquement** la mesurette de la boîte pour doser la poudre. 1 mesurette rase (4,5 g) pour 30 ml d'eau. Ne pas tasser la poudre dans la mesurette mais l'araser avec le dos d'un couteau propre et sec.

www.nutramigen2.fr (BE) (LUX) : +32 (0)2 456 99 61 www.nutramigen.be

Prenez le nombre nécessaire de mesures arasées de poudre (cf. tableau ci-dessus). Conservez la mesurette dans la boîte.

Après le biberon, roulez-le et secouez-le jusqu'à dissolution complète de la poudre (au minimum 1 minute). Vérifiez la température sur l'intérieur de votre poignet.



5. Une fois reconstituée, la formule peut devenir rapidement impropre à la consommation. Donnez la formule immédiatement après sa préparation.

Une fois l'alimentation commencée, la formule doit être utilisée dans l'heure qui suit et ne pas être conservée au réfrigérateur. Jetez le restant de la formule préparée et nettoyez tous les ustensiles. **Ne congelez jamais une formule préparée.**

Contient : sulfate de manganèse, iodeure de sodium, acide folique, molybdate de sodium, phytoménadione, chlorure de chrome (III), sélénite de sodium, D-biotine, cholécalficérol, cyanocobalamine. **Nutriments pour 100g/100ml :** Energie (2098 kJ/284 kJ)/(501 kcal/68 kcal), matières grasses g (25/3,4) dont acides gras saturés g (10/1,35), acide linoléique g (4/0,54), acide α -linoléique mg (350/47), acide arachidonique mg (145/19,5), acide docosahexaénoïque mg (115/15,5), glucides g (55/7,4) dont sucres g (15/7,7), protéines g (14/1,88), sel g (0,6/0,08), vitamine A μ g ER (450/61), vitamine D μ g (12,5/1,58), vitamine E mg α -tocophérol (4,5/0,61), vitamine K μ g (65/8,7), vitamine C mg (60/8,1), thiamine mg (0,4/0,054), riboflavine mg (0,45/0,061), niacine mg (5/0,67), vitamine B6 mg (0,3/0,04), folates μ g-EFA (135/18,2), acide folique μ g (80/10,8), vitamine B12 μ g (1,5/0,2), biotine μ g (15/2), acide panthothénique mg (2,5/0,34), sodium mg (240/32), potassium mg (610/82), chlorure mg (480/65), calcium mg (570/76), phosphore mg (390/52), magnésium mg (38/5), fer mg (9/1,21), zinc mg (3,5/0,47), cuivre mg (0,38/0,05), manganèse mg (0,125/0,017), sélénium μ g (17,5/2,4), chrome μ g (11/1,48), molybdène μ g (28/3,8), iode μ g (115/15,5), choline mg (165/22), inositol mg (85/11,4), L-carnitine mg (12,5/1,68), taurine mg (30/4), osmolarité = 270 mOsm/L.

(FR) Reckitt Benckiser France, 38 Rue Victor Basch, 91300 Massy, France. (BE) (LUX) Reckitt Benckiser Healthcare (Belgium) NV/SA, Allée de la Recherche 20, B-1070 Bruxelles, Belgique.

Fabriquée par : Mead Johnson Nutrition, 725 East Main Ave, Zeeland, Michigan 49464, USA.

*Marque déposée de Mead Johnson Nutrition. ©2020 Reckitt Benckiser France/Belgique

LG6® est une marque déposée de Chr. Hansen A/S.

A consommer de préférence avant le

(EXP) : voir sous la boîte.

Conditionné sous atmosphère protectrice.

400g e

