

<b>Marque</b>	<b>Urilys-Forte® CE classe IIa</b>
<b>IFU</b>	<p>Urilys-Forte®</p> <p>Dispositif médical CE 0481</p> <p>2 g de D-mannose</p> <p>Cystite</p> <p><b>- Contribue au traitement des cystites ou des infections urinaires (provoquées par l'E. coli)</b></p> <p><b>- Pour la prévention des cystites ou des infections urinaires récurrentes (provoquées par l'E. coli)</b></p> <p><b>Conseils</b></p> <p>Lisez attentivement la notice avant de prendre Urilys-Forte, même si vous avez déjà pris ce dispositif médical auparavant. Pour un résultat optimal, Urilys-Forte doit être pris comme décrit dans la notice. Conservez la notice au cas où vous auriez besoin de la relire.</p> <p><b>Indications</b></p> <p>Urilys-Forte contribue au traitement et à la prévention des cystites ou des infections urinaires récurrentes provoquées par l'E. coli.</p> <p>Une infection bactérienne des voies urinaires ou cystite est généralement causée par des bactéries qui pénètrent dans les voies urinaires depuis l'intestin en passant par l'urètre. Là, elles adhèrent à la paroi de la vessie ou à d'autres parties des voies urinaires et provoquent une infection.</p> <p><b>Une infection urinaire peut s'accompagner d'un ou de plusieurs des symptômes suivants :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Une sensation de brûlure ou de douleur pendant la miction</li> <li>- Une envie urgente d'uriner</li> <li>- Un besoin fréquent d'uriner</li> <li>- Des douleurs au niveau du bas-ventre</li> </ul> <p><b>Mécanisme d'action d'Urilys-Forte</b></p> <p>Le composant actif d'Urilys-Forte est le D-mannose. Le D-mannose est naturellement présent dans le corps humain, en petites quantités. Le D-mannose se fixe aux bactéries E. coli et les empêche d'adhérer aux parois des voies urinaires. Les bactéries sont ensuite facilement éliminées de la vessie par l'urine lors de la miction.</p> <p><b>Dosage et utilisation</b></p> <p>Urilys-Forte est indiqué pour les adultes de plus de 18 ans:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En complément d'un traitement de la cystite :</li> </ul>

- 1 comprimé effervescent 2x par jour
- La prévention des cystites récurrentes :  
1 comprimé effervescent par jour

Dissoudre le comprimé effervescent dans un verre d'eau (200 ml) et bien mélanger. Boire la solution immédiatement. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Il est recommandé de boire au moins 2 litres d'eau par jour pour faciliter la miction.

**Durée d'utilisation :**

N'utilisez pas Urilys-Forte pendant plus de 30 jours consécutifs. Après 4 jours d'interruption, la cure peut être reprise.

En plus du dispositif médical **Urilys-Forte**, il existe également le complément alimentaire **Urilys-Comfort** à base d'extrait de canneberge et de verge d'or qui peut être pris sur une plus longue période. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Effets indésirables :**

Urilys-Forte est bien toléré et ne présente que peu d'effets indésirables. La diarrhée peut être un effet indésirable, mais survient très rarement.

**Utilisation pendant la grossesse ou l'allaitement :**

Il n'y a pas suffisamment d'informations disponibles sur l'utilisation d'Urilys-Forte pendant la grossesse ou l'allaitement. Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce dispositif médical.

**<warning symbol> Attention :**

- Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité ou d'allergie à l'un des composants.
- En cas de surdosage, des troubles peuvent survenir, comme des ballonnements, des douleurs d'estomac et de la diarrhée.
- Conserver hors de la portée des jeunes enfants.
- Si vous présentez une réaction allergique, arrêtez d'utiliser Urilys-Forte.

**Consultez votre médecin ou pharmacien quand :**

- il y a du sang dans vos urines
- les symptômes s'aggravent
- vous n'avez observé aucune amélioration notable des symptômes après 3 jours d'utilisation d'Urilys-Forte
- vous souffrez d'un problème médical sous-jacent ou prenez des médicaments

- vous présentez des symptômes tels qu'une fièvre de 38 °C ou plus, des frissons, des nausées, des vomissements ou de la diarrhée. Vous pouvez alors souffrir d'une infection des voies urinaires supérieures, qui nécessite un traitement supplémentaire
- vous avez déjà souffert de calculs rénaux dans le passé.

**Composition :**

Acide citrique, 2 g de D-mannose, bicarbonate de sodium, amidon de maïs, poudre de betterave rouge, sorbitol, extrait de canneberge, inuline, sucralose.

Contient 2 gde D-mannose par comprimé effervescent.

Arôme naturel de baies

Ne contient aucun allergène et convient pour les végétaliens.

**Contenu :**

14 comprimés effervescents

**<storage temperature symbol (5-25 °C) >**

**Conservation :**

À conserver à température ambiante (5-25 °C) dans un endroit sec et sombre, dans son emballage d'origine. À conserver hors de la portée des enfants.

**<best before symbol> Date de péremption**

Voir l'emballage. Ne pas utiliser après cette date.

**Dispositif médical**

Urilyl-Forte est un dispositif médical de classe IIa suivant la directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

Date de la dernière révision des présentes instructions : Mars 2021

• 073088 - V1.2

Urilyl-Forte est une marque déposée d'EG et est produit sous licence de PK.

<manufacturer symbol> PK Benelux BV

Vluchtoord 17, 5406 XP Uden, NL

CE 0481

**Distributeur**

EG nv/sa

Esplanade Heysel b22, 1020 Bruxelles, BE

[www.urilys.be](http://www.urilys.be)



Caring for People's Health