

Notice ToulaKids

Caractéristiques du produit

Toulakids est un sirop calmant utilisé pour le traitement de la gorge irritée et de la toux sèche chez les bébés et les enfants. Ce produit contient du glycérol qui forme une fine couche de protection dans la gorge, ce qui permet de calmer et d'atténuer la toux.

Quand l'utiliser ?

Pour calmer l'irritation de la gorge associée à une toux sèche.

Pour protéger contre des facteurs environnementaux (air sec, poussières, fumée de cigarette, etc.)

Consignes d'utilisation

Utilisez la seringue de dosage fournie dans la boîte.

Enfoncez la seringue dans le flacon et tirez sur le piston d'aspiration jusqu'à la ligne noire de dosage, ce qui correspond à une dose de 5 ml. Mettez ensuite l'embout de la seringue dans la bouche du bébé.

Poussez ensuite doucement sur le piston pour faire couler le sirop lentement dans la bouche du bébé et lui laisser le temps d'avaler le sirop.

Dosage

Bébés de 6 à 12 mois : 1 x 5 ml, max. 3 à 4 fois par jour.

Enfants de 1 à 6 ans : 2 x 5 ml, max. 3 à 4 fois par jour.

Enfants de 6 à 12 ans : 1 cuillère à soupe (15 ml), max. 3 à 4 fois par jour.

Adultes et enfants à partir de 12 ans : 1 cuillère à soupe (15 ml), max. 4 à 6 fois par jour.

Ne pas dépasser les doses susmentionnées. Ne doubler en aucun cas la dose si vous avez oublié d'en administrer une.

Veillez nettoyer la seringue à l'eau après chaque utilisation. Ne pas mettre la seringue au lave-vaisselle, ne pas stériliser et ne pas mettre au four à micro-ondes.

Avertissements

Ne pas utiliser

- chez les bébés de moins de 6 mois
- en cas d'allergie à l'un des composants du sirop
- en cas d'intolérance héréditaire au fructose.

Il est conseillé de consulter votre médecin pour les bébés de 6 à 12 mois.

Vous devriez aussi consulter votre médecin en cas de signes de gravité associés à la toux sèche (tels que difficulté à respirer, fièvre persistante au-delà de 3 jours, vomissements répétés, difficultés à s'alimenter, diarrhée, modifications du comportement ou trouble du sommeil).

Eviter tout contact avec les yeux et le nez. En cas de contact involontaire avec le nez, les yeux ou les oreilles du nourrisson/enfant, rincer le sirop, de préférence à l'aide de sérum physiologique. Tenir la pipette hors de la portée des enfants.

Excipients

Glycérol, eau purifiée, maltitol liquide, acide citrique monohydrate, aromatisant à la fraise, sorbate de potassium, benzoate de sodium.

Conservation

A conserver sous 25°C. TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTEE DES ENFANTS.

Ne pas utiliser ToulaKids au-delà de la date mentionnée sur la boîte et sur l'étiquette.

Après ouverture, le sirop se conserve encore pendant trois mois maximum.

Présentation et conditions délivrance

Flacon de 180 ml avec seringue de dosage de 5 ml.

Vente libre.

Date du marquage CE : 2016

Date de la dernière révision de la notice : mars 2016

**Fabricant :**

Laboratoires Qualiphar N.V.

Rijksweg 9

2880 Bornem, Belgique



Seringue de dosage :



Fabricant : Rovipharm Z.A. de Lucinges, 01370 Treffort, France

