

DYNA⁺
S.A. NV

Reductin[®]

Comprimés / Tabletten

100

Comprimés
Tabletten

2 à 4

Par jour
Per dag



+ de 18 ans
+ dan 18 jaar



Voie orale
Oraal gebruik

Reductin

Comprimés / Tabletten

Analyse nutritionnelle Voedingsanalyse

	Pour 1 comprimé Voor 1 tablet	Par 100 gr Per 100 gr
Protides / Eiwitten (gr)	0,1	1,0
Lipides / Vetten (gr)	Traces	0,3
Glucides / Koolhydraten	0,60	0,8
Kcal	1,60	19,7
Kj	6,69	82,45

Dyna+ SARL
17, Bd. Grande-Duchesse Charlotte
1331 Luxembourg
www.reductin.lu

Poids net:
Netto gewicht: 90g

Complément alimentaire aux vitamines et minéraux Voedingssupplement met vitaminen en mineralen

*Contient de la caféine, déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes (18 mg/portion journalière)
Bevat cafeïne, niet aanbevolen voor kinderen en zwangere vrouwen (18 mg/dagelijkse dosis)

INGRÉDIENTS INGREDIËNTEN	Pour 100 g Voor 100 g	1 comprimé 1 tablet	% AJD / ADH pour 1 comprimé voor 1 tablet
Extrait de cannelle (écorce) - Kaneelextract (schors) - <i>Cinnamomum verum</i>	16,6 g	150 mg	-
Extrait de guarana (graine)* (12% caféine) - Guarana-extract (zaad)* - <i>Paullinia cupana</i>	16,6 g	150 mg	-
Cellulose microcristaline Microcristaline celluloso	15,5 g	140,48 mg	-
Phosphate dicalcique - Dicalcium fosfaat	11,1 g	99,7 mg	-
Nopal (racine) - Cactusvijgen (wortel) <i>Opuntia ficus indica</i> L.	7,8 g	70 mg	-
Extrait de Reine des prés (fleurs) Moerasspirea-extract (bloem) <i>Filipendula ulmaria</i> L. <i>maxim</i>	11,1 g	100 mg	-
Oxyde de magnésium - Magnesiumoxyde	7,386 g	60,52 mg	9,4%
Phosphate tricalcique - Tricalcium fosfaat	4,43 g	40 mg	-
Stéarate de magnésium - Magnesiumstearaat	1,88 g	17 mg	-
Crocus Sativus Satiereal® (extrait de safran) (saffraan-extract)	5,5g	50 mg	-
Chrome picolinate - Chroompicolinaat	0,033 g	0,3 mg	97,2%

REDUCTIN® contient une formulation brevetée permettant un contrôle de sa masse corporelle grâce à une synergie d'actions.

1. Indication: REDUCTIN® contient du chrome qui contribue au maintien d'une glycémie normale.

2. Conseil d'utilisation:
2 à 4 comprimés/jour

3. Mode d'emploi: Voie orale. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose journalière indiquée sans avis médical. Ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée, et à un mode de vie sain. Ne pas utiliser en cas de grossesse. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre la dépression. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.

REDUCTIN® bevat een gepatenteerde formulering die je toelaat uw lichaamssmassa onder controle te houden, dankzij een synergie van meerdere werkingen.

1. Werking: REDUCTIN® bevat Chroom wat bijdraagt tot het behouden van een normaal suikergehalte.

2. Gebruiksadvies:
2 tot 4 tabletten/dag

3. Gebruiksaanwijzing: Oraal gebruik. Buiten het bereik van kinderen bewaren. De aanbevolen hoeveelheid niet overschrijden zonder medisch toezicht. Vervangt in geen enkel geval een evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van depressie behandeling. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.